

193

Aus der Kinderklinik der Martin-Luther-Universität Halle (Saale)
(Direktor: Prof. Dr. Goebel)

Über die Wirkung des Sesamöles auf die Zahl der Thrombocyten nebst Bemerkungen zu der Zählmethode nach Jürgens.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
der

Hohen Medizinischen Fakultät
der

Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg

vorgelegt von

Wolfgang Runze

aus Ratibor

HAMBURG 1938

1. Berichterstatter: Prof. Dr. G o e b e l
2. Berichterstatter: Prof. Dr. C o b e t

Tag der mündlichen Prüfung: 18.2.38.

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

I.

Die folgenden Ausführungen sollen die Frage beantworten, ob beim Morbus maculosus Werlhofii durch Sesamölapplikation eine Thrombocytose herbeigeführt werden kann. Auf das klinische Krankheitsbild soll nicht näher eingegangen werden. Es genügt darauf hinzuweisen, dass als Charakteristikum dieser Erkrankung der auffallende Blutplättchenschwund, bzw. eine mangelhafte Thrombopoese gelten. Aufmerksam gemacht durch die Arbeiten von E. S c h i f f und C. H. i r s c h b e r g e r suchte ich an Hand von Reihenversuchsanordnungen an 23 Kindern und Erwachsenen den Einfluss von Sesamöl auf die Blutplättchenzahl festzustellen. S c h i f f berichtet in seiner Arbeit, wie er bei Heilversuchen des Morb. Werlh. auf die Anwendung von Sesamöl gekommen ist. Er teilt günstige therapeutische Erfolge mit, bei denen er mit Vitamin A, bzw. dem Vitamin A Konzentrat "Vogan" auffallende Thrombocytenanstiege bis über 200000 erreichte. Nach Absetzung dieses Mittels fiel jedoch die Thrombocytenzahl bald wieder zur Ausgangszahl von rund 400000 ab. Dies war um so auffallender, als das Vitamin A nach allen bisherigen Erfahrungen besonders gut gespeichert wird und demnach eine anhaltendere Wirkung zu erwarten war. Es erhob sich die Frage, ob die Wirkung des Vogan auf dem Gehalt an Vitamin A beruht, oder ob andere Faktoren dabei eine Rolle spielten. Zur näheren Ergründung wurde zunächst der Einfluss des Provitamins des A Faktors, des Karotins, in öligem Lösung verwendet. Die Ergebnisse entsprachen, mit den Wirkungen des Voganöls verglichen, nicht den Erwartungen. Mit dem A Vitaminfreien Sesamöl, dem Öl, das zur Lösung des Vitamins verwendet wird, zeigte sich ein auffallender Anstieg der Blutplättchen. Damit schien bewiesen zu sein, dass " die Eigenschaft, eine Trombocytose herbeizuführen, nicht dem Vitamin A zukommt, sondern, dass der Thrombocytosefaktor im Lösungsmittel, dem Sesamöl selbst, zu suchen ist. " In anderen Ölen liess sich dieser Thrombocytosefaktor ,

der noch unbekannte fettlösliche "T" Faktor, der vielleicht in die Gruppe der fettlöslichen Vitamine gehört, nicht nachweisen. Der Thrombocytensturz, der sich bald nach Absetzung dieses "T" Faktors einstellte, konnte nur durch Eigelb, Voganöl und Sesamöl verhindert werden, während alle anderen Vitamine und Öle in dieser Richtung vollkommen versagten. Ich unternahm es, das Vorhandensein dieses "T" Faktors im Sesamöl durch Reihenuntersuchungen unter bestimmten Bedingungen nachzuprüfen.

II.

Von über 50 Zählmethoden zur Thrombocytenbestimmung haben sich zwei besonders geeignet und zuverlässig erwiesen, die vergleichende Zählung nach F o n i o (1912) und die "Mikromethode zur Thrombocytenzählung (Hautblut-Methode)" nach J ü r g e n s (1934). Nach den Arbeiten von G e r l o f f , B e c k e r , K a s s a y - F a r k a s , L o r e n z , die die mit diesen beiden Zählmethoden gefundenen Thrombocytenwerte miteinander verglichen, ist die Jürgens'sche Zählung die Methode der Wahl. B o s h a m m e r kam bei umfangreichen vergleichenden Untersuchungen mit verschiedenen Zählmethoden zu dem Ergebnis, dass die Methoden die besten sind, welche die höchsten Werte liefern, weil sie der absoluten Thrombocytenzahl im Blute am nächsten kommen. Dieser Grundforderung kommt die Jürgens'sche Methode am vollkommensten nach. Eine zweite wichtige Voraussetzung für Reihenuntersuchungen verlangt von einer Zählmethode zuverlässige Werte, die konstant bleiben und nicht grössere Schwankungen aufzeigen. Nach K a s s a y - F a r k a s , G e r l o f f s , A l s und den eigenen Erfahrungen unterliegen die Zahlen bei der Fonio'schen Methode großen Schwankungen. Mehrere unter gleichen Bedingungen hergestellte Blutaussstriche wiesen Differenzen von Werten bis zu 100000 auf, während bei der Jürgens'schen Zählung die Unterschiede nicht über 10000 hinausgehen. Daher legte ich meinen Untersuchungen die Jürgens'sche Methode zu Grunde. Sie verlangt allerdings Übung und

Einarbeitung.

Zur Ausführung der Methode wird ein von der Firma E. Leitz geliefertes Besteck benutzt.

Nach einem warmen Handbad wird die Hand gut abgetrocknet, die Fingerbeere mit Aether abgetupft und darauf mit geschmolzenem Paraffin mittels eines Mulltupfers bestrichen. Das Paraffin erstarrt sofort auf der Fingerbeere. Jetzt wird mit der Frank'schen Nadel 3 mm tief in die paraffinierte Fingerbeere eingestochen. Darauf wird sehr rasch das hervorquellende Blut, welches sich in der kleinen, durch Nadeldruck verursachten Hautdelle auf dem Paraffin gesammelt hat, in die dem Besteck beigegebene Pipette nach angegebener Vorschrift innerhalb einer 10% Natr.citr.Lösung gepuffert aufgezogen. Der Inhalt der Pipette wird jetzt langsam in eins der dem Besteck beigegegebenen Senkungsröhrchen ausgeblasen. Durch zweimaliges Ansaugen und Ausblasen wird das Blut mit dem Citrat in dem Senkungsröhrchen gemischt und stehen gelassen. Man lässt so lange absenken, bis sich ein Drittel der Blutmenge als Plasma abgesetzt hat. Das überstehende Plasma wird dann mit der beigegebenen Leukocytenpipette bis zu einer bestimmten Marke angesaugt und mit der beigegebenen Mischlösung verdünnt. Die Pipette wird jetzt zur gründlichen Durchmischung 2 Minut. geschüttelt und mit dem Inhalt eine Zählkammer nach Thoma-Zeiss beschickt (die einfache alte Ausführung mit rundem Ablaufrand, da bei den neuen Kammern mit geradem Rand Austrocknung entsteht.) Nach längerem Absetzen wird ausgezählt und berechnet wie bei der Leukocytenzählung.

Nach meinen Erfahrungen genügt es, die schlauchlose Pipette schräg nach unten in den Blutspiegel zu halten, wobei durch Kapillarattraktion die einzustellende Blutmenge bequemer als mit dem Schlauchansatz abgemessen werden kann. J ü r g e n s schreibt für seine Methode Zählkammern mit rundem Ablaufrand vor. Da solche Kammern in grösseren Mengen schwer zu beschaffen sind, habe ich mir so geholfen, dass ich gewöhnliche Zeiss'sche Zählkammern im Laufe der mehrstündigen Untersuchungen in feuchte Kammern legte (zugedeckelte Petrischalen mit angefeuchtetem Fliesspapier und Streichholzbalken als Unterlage). Veränderungen traten erst

ein, wenn die Kammern länger als 5 Stunden in dem feuchten Medium gehalten wurden. Was die Auszählung selbst anbetrifft, so ist es nicht notwendig, alle Quadrate auszuzählen, sondern die Auszählung der Hälfte ergibt nach entsprechender Umrechnung die gleichen Werte, da die Thrombocyten in der Kammer gleichmässig verteilt sind. Auf Grund meiner Untersuchungen kann ich die Angabe G e r l o f f s bestätigen, daß man bei Gesunden nur bis zu 13% niedrigere Werte erhält, als die von J ü r g e n s als Norm (450000 - 800000) angegebenen, während K a s s a y - F a r k a s 42% angibt. Ich konnte mit diesem Autoren im Gegensatz zu B e c k e r bestätigen, dass die Thrombocytenzahl von Alter unabhängig ist. So zeigt z.B. ein 4 Monate alter Säugling einen Durchschnittswert von 577400 Thromboc., ein 9 Monate altes Mädchen 720200, ein 3 1/2 Jahre alter Junge 552500, ein 9 Jahre alter Knabe einen Durchschnittswert von 470000, ein 14 Jahre altes Mädchen einen Wert von 500400 und eine erwachsene Schwester 462600 Trombocyten.

III.

Aus der Arbeit von S c h i f f geht nicht klar hervor, welche Auszählmethode bei seiner Thrombocytenbestimmung verwendet wurde. Nach den Protokollen ist anzunehmen, dass die Fonio'sche Methode Anwendung fand. Es stösst natürlich auf gewisse Schwierigkeiten, mit verschiedenen Methoden gewonnene Ergebnisse genauer vergleichen zu wollen. Für meine Fragestellung aber kommt es auf die Schwankungen an, nicht auf die absoluten Werte. Diese Schwankungen können nach der Jürgens'schen Methode genauer bestimmt werden. Es ist bekannt, dass die Blutplättchen im Laufe eines Tages Mengenschwankungen durchmachen, die teils alimentär bedingt, teils abhängig von Ruhe und Bewegung sind. Um einen annähernd normalen Ausgangswert für die Untersuchungen zu erhalten, stellte ich viermal jeden Tag zu derselben Tageszeit und bei nüchternem Zustand der Untersuchten die Anzahl der Thrombocyten fest. Den Durchschnittswert der vier Ergebnisse nahm ich als

Grundzahl für die weiteren Untersuchungen.

Vom 13. Tag an erhielten die Kinder regelmässig zur bestimmten Tageszeit Sesamöl. Wo es in reiner Form widerwillig genommen wurde, setzte ich Himbeersyrup zu. Jeden 3. Tag im Ganzen sechsmal wurden die Thrombocytenwerte bestimmt.

Nach Absetzen des Mittels überprüfte ich jeden 3. Tag im Ganzen dreimal den nachhaltenden Einfluss des Sesamöls auf die Thrombocytenzahl.

Die Kurven demonstrieren das Verhalten der Thrombocyten vor Zugabe des Sesamöls bei Kindern, die normalen Blutstatus aufweisen. Sie zeigen, wie im Laufe von 10 Tagen die Kurve schwankt, wenn auch die Blutentnahme regelmässig zur gleichen Tageszeit und im gleichen Nüchternzustand vorgenommen wird. Ia u. Ib.

Die Durchschnittswerte der Plättchen aller untersuchten Kinder vor Zugabe des Sesamöls pendeln zwischen 400- 700000, entsprechen also den Werten nach J ü r g e n s , B e c k e r und L o r e n z . Nur in zwei Fällen liegt die Durchschnittszahl tiefer. In dem einen Fall handelt es sich um einen Thrombocytenwert, der im Laufe der ganzen Untersuchung sehr starken Schwankungen unterlag, bei dem anderen kann es an der Technik gelegen haben. Ich gehe auf beide Fälle noch genauer ein. II.

Die Tabellen (IIIa und IIIb) geben einen Überblick über die Wirkungsweise des Sesamöls bei den Kindern, die jeden Tag 10 Tropfen Öl bekamen, eine Menge, die auch E. S c h i f f und H i r s c h b e r g e r für ihre Untersuchungen zugrunde legten. Die letzten drei Zahlen bedeuten die Anzahl der Thrombocyten nach Absetzen des Mittels. Auf den Tabellen steigt also nach der Gabe von 10 Tropfen Sesamöl die Zahl der Thrombocyten an. Die auffallendste Wirkung zeigt sich bei Jutta Fl.. Bei den anderen Kindern ist zwar auch eine Zunahme in den ersten Tagen festzustellen, aber sie ist geringer. Fast allen gemeinsam ist die Erscheinung, dass nach Absetzung des Öls die Thrombocyten schlagartig zur Norm abfallen. Zugleich aber lassen die Kurven grosse Thrombocytenzahlschwankungen während der Dauer der Darreichung erkennen.

So ermutigend hinsichtlich des therapeutischen Erfol-

ges auf den erstenBlick die Kurven (IIIa u.IIIb) aus-
sehen, so lassen sie doch bei kritischer Betrachtung
erkennen, dass eigentlich nur bei sechs von den neun
Untersuchten die Erwartungen einigermaßen erfüllt
wurden.

Bei Helmut H. ist nur der zweite, sechste und sie-
bente Wert über derDurchschnittszahl erhöht,wenn wir
400000 Thrombocyten als Norm bei ihm annehmen. Der
dritte und fünfte sehr tiefe Wert beruht sicher auf
einem Fehler bei der Auszählung und muss ausgeschal-
tet werden.

Bei Wilfried M. verläuft die Kurve in der Zeit der
Ölgabe in etwa gleicher Höhe, nur der zweite Wert von
810400 ist etwas höher als der dritte Normalausgangs-
wert von 684500 vor der Ölgabe. Auffallend ist auch
hier das geringe Ansteigen der Thrombocyten nach Ab-
setzen des Mittels mit dem bald wieder folgenden Ab-
fall zur Norm. Auch Wolfgang V. zeigt eine Erhöhung
der Thrombocytenzahl um 90000 am Anfang, aber baldi-
ges Abgleiten zur Norm mit einer geringen Erhöhung
(30000) des letzten Wertes gegenüber der Normalzahl,
so dass man auch hier von einem starken Einfluss des
"T" Faktors nicht sprechen kann. Während die in den
Kurven dargestellten Zählungsergebnisse von neun Kin-
dern immerhin einen gewissen Einfluss des Öls auf die
Thrombocyten im Sinne einer Vermehrung zu beweisen
scheinen, ergab sich bei Zählungen an sechs weiteren
Kindern unter den gleichen Bedingungen überhaupt kei-
ne eindeutige Beeinflussung derThrombocytenzahl durch
das Öl. Von einer graphischen Darstellung glaube ich
absehen zu dürfen. III c.

Im Einzelnen zeigt sich bei Kind Horst Tr. (9 J. nor-
maler Blutbefund) nach Beginn der Ölgaben ein Abfall
der ersten vier Zahlen (680, 580, 420, 570000) unter
die Norm von 720000. Erst an den sechs letzten Öltä-
gen kehren die Zahlen zum Normalwert zurück. Auffäl-
lig ist auch hier der Abfall nach Absetzen des Öls,
der Werte erreicht, die um 300000 geringer sind als
die ursprünglichen Ausgangswerte.

Bei Fritz A. (12 1/2 J. normaler Blutbefund) ist erst
am fünfzehnten Öltag der Normwert etwas überschritten,
im übrigen bewegen sich die Werte zum Teil noch un -

ter den Normalzahlen.

Gertrud Sp. ($6\frac{1}{2}$ J. norm. Bltbef.) zeigt nur am 12. und 15. Tag eine Erhöhung von 60000 Thrombocyten, sonst aber nur ein geringes Schwanken um die Normalzahlen.

Bei Anneliese B. ($4\frac{1}{2}$ J. norm. Bltbef.) hat das Sesamöl gar keinen Einfluss ausgeübt. Alle Werte bewegen sich in keiner Kurve, wie sie ohne Ölzugabe verlaufen könnte.

Wolfgang F. (7 Mon. norm. Bltbef.) zeigt nur am 3. und 15. Tag eine wesentliche Erhöhung um 200000 bzw. 300000 Thrombocyten.

Irmgard G. (7 J. norm. Bltbef.) zeigt sogar einen Abfall während der Ölzeit. Der Durchschnittswert beträgt vor der Ölgabe 819000, während der Ölzeit 591000 Thromboc.

Von den 15 hier angeführten Beobachtungen können wir demnach sechs

(Margot J., Jutta Fl., Kurt H. Tab.

Hans S., Hansine v.W., Anny H. Tab.)

herausstellen, bei denen es den Eindruck macht, dass das Sesamöl die Thrombocytenwerte erhöht haben könnte. Das sind rund 40%, während man bei den übrigen einen nennenswerten Einfluss des "T" Faktors im Sinne einer Thrombocytose nicht wird anerkennen können. Es erhebt sich nun die Frage, ob ein Einfluss des Sesamöls feststellbar ist, wenn man mit veränderter Dosierung und unter anderen Untersuchungsbedingungen arbeitet. K. B a t e r a u, die in ihrer Arbeit S c h i f f s Ergebnisse nachprüfte, gab bei fünf Kindern von ihren sieben untersuchten wesentlich höhere Ölmengen. Sie berichtet, wie nach dreimal täglicher Gabe von 5-15 ccm. Sesamöl die Thrombocyten nicht anstiegen, sondern im Gegenteil die Werte während der Darreichung von Sesamöl stark herabfielen. Ein 7 jähriger Knabe wies zu Beginn der Beobachtung eine Verminderung der Thrombocytenwerte von 438000 auf 208000 auf. Während der Darreichung von Sesamöl stiegen die Zahlen zuerst auf 495000 an, bei weiteren Sesamölgaben sanken sie wieder auf 155000 Thromboc. ab. Nach Absetzen des Sesamöls folgte wieder ein Anstieg auf

405000 Thromboc. Ein anderer Fall zeigte in der Vorperiode Werte zwischen 1177800 und 547000. Nach Zugabe von Sesamöl sanken die Thrombocytenzahlen zuerst auf 424000 ab. Bei weiterer Sesamölgabe schwankten die Werte zwischen 984000 und 418000. Nach Absetzen von Sesamöl folgte zuerst ein Absinken auf 85000, später ein Anstieg auf 950000 Thromb. Ein drittes Kind zeigte in der Vorperiode Thrombocytenwerte zwischen 234000 und 400000. Während der Darreichung von Sesamöl schwankten die Zahlen zwischen 241000 und 378000 Thromboc. In der Nachperiode wurden Werte zwischen 184000 und 258000 gefunden. Das letzte Kind zeigte zu Beginn der Beobachtung einen Abfall der Werte von 442000 auf 129000. Während der Darreichung von Sesamöl stiegen die Zahlen zuerst auf 319000 an, sanken aber danach auf 247000 ab.

Um zunächst die Wirkung des Sesamöls mit kleineren Dosen zu prüfen, gab ich einem dreijährigen Kind und einer Krankenschwester fünf bzw. zwei Tropfen unter den gleichen bisherigen Bedingungen. Bei diesen neuen Untersuchungen zog ich auch Erwachsene heran, um wie es Hirschberger gemacht hat, auch an diesen den Erfolg zu prüfen. Beide Untersuchten lassen keine deutliche Einwirkung erkennen. Bei der Schwester ist der zweite und fünfte Wert von 438400 bzw. 468000 am 6. und 15. Tag höher als der Ausgangswert von 350000 aber nicht in solch einer Masse, dass man von einem sicheren Einfluss eines "T" Faktors sprechen könnte. Bei Christa könnte der abnorm tiefe dritte und fünfte Wert am 9. und 15. Tag auf einem technischen Fehler beruhen, da das Plasma 30 Min. lang mittels Fahrrades in das Laboratorium geschafft wurde.

IV.

Interessant war das Verhalten von eineiigen Zwillingen (Mädchen von 7 Mon. Ursula und Helga), bei denen ich die Wirkungsweise des Sesamöls bei gleicher Konstitution unter variierenden Dosierungen beobachten konnte. Bei Ursula konnte ich aus äusseren Gründen nur zwei Normalwerte von 580000 bzw. 687200 Thromboc. fest

stellen. Tägliche Gabe von 6 Tropfen Sesamöl 14 Tage lang brachte keine wesentliche Zunahme der Thrombocyten. Der zweite Wert von 276000 am 6. Tage innerhalb der Ölzeit zeigt im Gegenteil einen auffallend tiefen Stand. Anschliessende Erhöhung auf 10 Tropfen am 15. Tage der Ölgabe zeigte nach folgenden acht Tagen Werte, die nur um 20000 höher lagen als der zweite normale Ausgangswert. Auffallend ist auch hier das rasche Absinken nach Absetzen des Öls auf Werte, die wesentlich kleiner sind als die Durchschnittszahlen. Ohne Ölzugabe zeigen die Werte bei Helga bis zum 15. Tage einen verhältnismässig gleichen Stand wie bei Ursel, die vom 3. Tage Sesamöl bekommen hatte. Um das Verhalten der Thrombocyten bei ganz kleinen Gaben zu prüfen, bekam nun vom 15. Tag ab Helga täglich 2 Tropfen Öl. Die Werte vom 18., 21. und 24. Tag lassen keinen Einfluss erkennen. Auffallend sind bei Helga die stark ansteigend letzten Werte nach Absetzen des Sesamöls, die ganz im Gegensatz zu ihrer Schwester Ursula stehen.

V.

Um die Wirkung höherer Dosen festzustellen, bekamen Heinz Tr. (12 J.) und Fr. Dr. R.-G. je 20 und W. Runze 40 Tropfen täglich, nachdem bei ihnen, wie bei den anderen auch, zunächst dreimal jeden dritten Tag die Normalwerte festgestellt worden waren. Bei Heinz Tr. ergibt nur der neunte Tag innerhalb der Ölzeit eine Erhöhung der Thrombocytenzahl um 70000, die in den folgenden Tagen wieder zur Norm von 450000 abfällt. Nach Absetzen des Mittels zeigt der erste Wert einen Anstieg der Thrombocyten im Gegensatz zu den sonstigen Erfahrungen, die einen raschen Abfall nach Aufhören des Ölzusatzes ergeben hatten. Bei Fr. Dr. R.-G. zeigten die ersten vier Werte innerhalb der Ölzeit eine Erhöhung der Thrombocyten um rund 80000. Die beiden letzten Werte am 15. und 18. Tag fallen dagegen wieder zur Norm von 440000 ab. Nach Absetzen des Mittels trat auch hier wieder zunächst ein kritischer Abfall bis unter die Norm ein und ein baldiges Angleichen an die Ausgangswerte. In diesem Fall vermehrten sich also


die Thrombocyten um ein geringes auf das Sesamöl hin, während sie bei Heinz Tr. ziemlich unverändert blieben.

W. Runze zeigte im eigenen Versuch nur am 6. Tag eine Ansprechbarkeit bei täglicher Einnahme von 40 Tropfen während die übrigen Werte dem Normalspiegel sich angleichen. Auffallend ist das Ansteigen der Thrombocyten nach Absetzen des Mittels und allmähliches Angleichen an die Normalzahl.


VI.

In ihrer Arbeit führte E. Hirschberger Eigenversuche mit 20 Tropfen durch. Es stiegen bei ihr dagegen innerhalb von 28 Tagen die Thrombocyten von 318000 auf 824000 an.

Aus dem Gedanken, nicht immer dasselbe Öl aus derselben Lieferung bei meinen Versuchen zu verwenden und etwaige Fehlerquellen darauf zurückzuführen, benutzte ich bei Geschwister W., Christa Eil., Schwester Ursel ein Originalöl der Firma "Merck", während bei allen anderen Versuchen offizinelles Sesamöl verwendet wurde. Ein Unterschied zwischen beiden Ölen in ihrer Wirkung bzw. Gehalt an fettlöslichem "T" Faktor bestand nicht. Ein ganz eigenartiges Verhalten fand ich während meiner Untersuchungen bei der Schwester Hanna, die auch 20 Tropfen Sesamöl bekam. Hierbei fielen mir am Anfang grosse Schwankungen der ersten sehr niedrig liegenden Normalwerte auf. Der zweite Wert am sechsten Tag der Ölgabenzeit betrug 68200 Thromboc. Um einen Fehler auszuschliessen, zählte ich nach zwei Stunden wieder und stellte die etwas erhöhte Zahl von 81400 Thrombocyten fest. Vergleichende Untersuchungen vom 21. Tag ab nach F o n i o bestätigten den abnormen Tiefstand der Thrombocyten. Nach Absetzen des Mittels stiegen auch hier die Werte an und passten sich ihrem Ausgangswert von 250800 an. Blutungs- und Gerinnungszeiten waren bei Schwester Hanna normal. Am Blutbild liess sich keine erheblichen Abweichungen nachweisen. Wir haben es hier also mit einem eigenartigen Dauertiefstand der Thrombocyten zu tun, dessen Natur noch nicht geklärt ist.




		Alter	Krankheit
1. Jutta	Fl.	3 3/4 J.	Nephritis
2. Kurt	H.	9	J. Muskeldystroph.
3. Margot	J.	14	J. Chorea min.
4. Helmut	H.	12	J. Diabetes



		Alter	Krankheit
1. Winfried	M.	9 Mon.	Tbc.
2. Anny	H.	9 J.	Tbc.
3. Wolfgang	V.	4 1/4 J.	Tbc.
4. Hans	S.	3 1/2 J.	Tbc.
5. Hansine v.W.		10 J.	Polyarthr.

Tabelle IX



VII.

Schliesslich wurde der Einfluss des Sesamöl bei einem 1 $\frac{1}{4}$ Jahr alten Jungen nachgeprüft, der mit einem Morbus Werlhofii eingeliefert wurde, ein Krankheitsbild, das durch seine abnorm niedrige Thrombocytenzahl und verlängerte Blutungszeit charakterisiert ist. Die verkürzte Krankengeschichte lautet:

Am 2.X. bemerkte die Mutter des Hans Schw., dass dem Kinde blutig gefärbter Speichel aus dem Munde lief. Den Blutungsherd konnte sie nicht feststellen, da das Kind sich gegen den Versuch des Mundöffnens sperrte. Zwei Tage später fiel der Mutter der dünnbreiig und dunkelrot aussehende Stuhl auf. Es traten bläuliche Flecken von Stecknadelknopf- bis Pfennigstückgrösse am Kopf, am Gesäss und Schwellungen am Fussrücken auf. Bei der Einlieferung am 7.X. in die hiesige Klinik ergab sich folgender Befund:

Guter E. und K.Z. Hautfarbe gelblich, Wangenhaut ekzematös. Wenig stecknadelkopfgrosse Petechien an der Haut des ganzen Gesichtes. Am behaarten Kopf reichlich pfenniggrosse Haematome, die am Hinterkopf und in der Scheitelgegend von Erbsengrösse und harter Konsistenz sind. Die anderen Haematome sind weicher und ein-drückbar. An beiden Armen, am Stamm und besonders ausgeprägt an beiden Ober- und Unterschenkeln sind sehr zahlreiche Haematome sichtbar. Foetor ex ore. An der linken Wangenschleimhaut befinden sich linsengrosse Schleimhautblutungen. Einzelne kleine Lymphknoten sind am Hals tastbar. Lunge, Herz, Abdomen: o.B. Leichtes Ödem über beiden Fussrücken.

Z.N.S.: o.B.

Temperatur: 38,8

Blutstatus: 4,2 Mill. Erythr. 60% Hgb.

F.J. 0,78 Leukocyten: 9550

Blutausstrich: 1 Jgdl. 14 Stabk. 5 Eos.

1 Bas. 41 Segm. 38 Lymphoc.

26000 Thrombocyt.

Blutungszeit: über 17 Minut.

Blutgerinnungszeit: 4 $\frac{1}{4}$ Minut.

Während der Untersuchung Entleerung geringer Mengen faekulent riechenden Blutes aus dem Anus. Um der drohenden Blutung Einhalt zu gebieten, bekam der Patient 5 ccm Clauden intramuskul. Nach der Injektion traten noch zweimal Darmblutungen auf. Der allgemein drohenden Blutungsneigung wegen, musste zur Bluttransfusion von 180 ccm i.v. geschritten werden, dem wirkungsvollsten Mittel bei thrombopenischer Purpura. Leider verbot die Schwere des Krankheitsbildes, Versuche mit Sesamöl allein anzustellen. Im Verlauf der folgenden Tage verfolgte ich das Verhalten der Thrombocyten dieser Therapie gegenüber, auf das ich später noch genauer eingehen werde.

Am 8.X. sinkt die Blutungszeit schon auf 6 1/4 Minut. Die Blutgerinnungszeit beträgt 4 Minut. Am linken Unterschenkel und rechten Oberschenkel sieht man neue Petechien von nur Stecknadelkopfgrosse. Keine neuen Haematome, kein Blut im Stuhl und Urin. Am 10.X. beträgt die Blutungszeit 4 3/4 Minut. Hgb. 72% Haematome befinden sich nur noch am Hinterkopf und am linken Gesäss. Ablassen der Petechien. Weitere Besserung bis zur Entlassung am 24.X. Im Laufe des 1. Tages steigen die Werte von 26000 auf 70400 an. Der 2. Tag zeigt einen Wert von 88600, der 3. Tag 156200 und der 4. Tag 216800 Thrombocyten. Nur am Nachmittag des 4. Tages zeigt sich ein rascher Abfall auf 23200, der jedoch am folgenden Tage wieder der Normalgrenze zustrebt, und schliesslich am 6.Tag einen Wert von 517200 erreicht. Die folgenden Tage bringen weitere erfreuliche Höchstwerte, die am 14.Tage wieder mit einem Wert von 210000 unterbrochen werden. Von diesem Tage an wurden bis zur Entlassung täglich zweimal 3 Tropfen Vigantol gereicht. Die Ursache des Plättchensturzes von 768800 auf 211200 kann man kaum darauf zurückführen, da der nächste Tageswert von 973600 den normalen Durchschnittswert wieder weit übertrifft. Während des Klinikaufenthaltes bekam der Patient aus den oben angegebenen Gründen kein Sesamöl. Vom Tage der Entlassung an erhielt Hans Schw. täglich 8 Tropfen Sesamöl. Die fünf folgenden Werte von 900800, 804800, 753200, 980000 und 97100, jeden dritten Tag festge -

stellt, zeigen jedoch keinen wesentlichen Einfluß auf die Zahl der Blutplättchen. Nach Absetzen des Öls bewegen sich die Werte in der ungefähren Höhe der letzten Werte vor der Entlassung (920000).

VIII.

Um einen Vergleich zwischen den Durchschnittswerten aller Untersuchungen vor der Sesamölgabe und den Durchschnittswerten während der eigentlichen Ölzeit zu ziehen, stellte ich dieselben in der folgenden Kurve zusammen.

IX.

Von allen Untersuchungen weisen 12 höhere Werte als die Normalausgangswerte auf. Von diesen 12 können wir 3 herausstellen, bei denen man von einem wesentlichen Einfluss des "T" Faktor im Sesamöl sprechen könnte (Jutta Fl., Anny H., Hans S.). Wir müssen aber berücksichtigen, dass von den 23 einige Fälle streng genommen nicht dazu gehören, da bei ihnen die Untersuchungen mit ganz anderen Dosen angestellt wurden. B a - t e r e a u , die mit noch wesentlich höheren Dosen Untersuchungen angestellt hatte, kommt zu völlig negativen Ergebnissen.

Berücksichtigen wir bei unseren vergleichenden Betrachtungen die jeweiligen Erkrankungen der Prüflinge, so fällt uns auf, dass ein Thrombocytenanstieg nach Sesamöl nur bei tuberkulösen Erkrankungen auftrat. (Winfr.M., Anny H., Wolfg.V., Hans S.). Ob das bei Tuberkulose gesetzmässig ist, bleibt festzustellen. E.

A t t i l i o fand bei etwa 30 Untersuchungen tuberkulöser Kinder eine Verminderung der Blutplättchen, E. F a n t o n dagegen allerdings bei seinen nicht sehr zahlreichen Untersuchungen eine Vermehrung. In diesem Gegensatz könnten nur Untersuchungen nach einer einheitlichen Methode Klarheit bringen. Einen Einfluss anderer Krankheiten auf die Zahl der Thrombocyten kann man auf Grund der Untersuchungsergebnisse ab-

lehnen, im Gegensatz zu F a n t o n , der ein verschiedenartiges Verhalten der Plättchen bei manchen Krankheitsbildern fand. Bei Chorea, Diphtherie, Rheumatismus, Lungen Tbc. stellte er eine Verminderung der Thrombocyten fest, während meine Untersuchungen ein gleichbleibendes Verhalten bzw. Ansteigen der Throbocyten bei diesen Krankheitsbildern ergaben. Nur bei Bronchialdrüsen Tbc. und Tonsillitis waren die Blutplättchen bei seinen Untersuchungen vermehrt. Das Ansteigen der Werte nach Absetzen des Öls könnte man nach B e c k dahin auslegen, dass bei Infektionskrankheiten im Inkubationsstadium fast stets ein Ansteigen der Blutplättchen stattfindet, in der Fieberperiode ein starker Sturz erfolgt und in der Rekonvaleszenz ein erneuter Anstieg zur Norm. In Übereinstimmung mit S c h i f f blieben die **Erythrocyten**werte nach dem Ergebnis von 6 Untersuchungen durch den "T" Faktor unbeeinflusst.

X.

Wenn wir zum Schluss ganz allgemein die Wirkung des Sesamöls auf den haematopoetischen Apparat betrachten, so muss man zugeben, dass dem Sesamöl manchmal ein gewisser Einfluss zuzukommen scheint. Aber bei weitem nicht in dem Masse, wie es S c h i f f und H i r s c h b e r g e r in ihren Arbeiten angegeben haben. Meine Untersuchungsergebnisse bieten dagegen so viele Ausnahmen dar, dass der Standpunkt von B a t t e r e a u nicht unberechtigt zu sein scheint. Sie hat an Hand von 7 Untersuchungsergebnissen überhaupt jeden Einfluss des Sesamöls auf die Thrombocyten abgelehnt.

Therapeutisch würde sich das Sesamöl vielleicht zur Erzeugung kurzdauernder Thrombocytosen eignen, doch kommt es für Heilzwecke nicht in Betracht, da wir kein klinisches Anwendungsgebiet, keine praktische Indikation kennen, bei der man sich mit einer kurzfristigen Thrombocytenvermehrung begnügen könnte.

E. L o r e n z hat zur gleichen Zeit den besprochenen Fragenkomplex im Tierexperiment und zwar an Meer-

schweinchen nachgeprüft und hat im wesentlichen die gleichen Ergebnisse wie ich. Seine Versuche zeigen, dass nur dem Vitamin A (Vogan) eine Art regulierender Wirkung auf die Thrombocytopoese zukommt. Jedoch bedarf es zu dieser Annahme noch einer näheren experimentellen Bestätigung. Ich glaube sicher, dass Schiff bei seinen Untersuchungen über die Wirkung des Sesamöls, wenn er an einer grösseren Zahl von Kindern und nicht nur an ausgewählten Fällen mit niedrigen Thrombocytenwerten gearbeitet hat, zu anderen Werten gekommen wäre, etwa in der Richtung, wie sie meine Untersuchungen zeigen.

Am Schluss meiner Arbeit möchte ich nicht versäumen, Herrn Prof. Dr. G o e b e l für die Anregung zur Bearbeitung des Themas und für seine Beratungen meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.

S c h r i f t t u m .

- E. Attilio :Il compartimento delle piastrine nel sangue di bambini tuberculotici.
Pedriata riv. Jg. 1935 H. 11 S.588-94.
Auszug aus dem Zentralblatt f.d.ges. Kinderhkl.1929 Bd. 22 S.768.
- K. Batereau :Sesamöl und Thrombocyten.
Monatsschr.f.Kinderhkl. 69.Bd. 1937
S.389-392.
- Beck :Über das Verhalten der Blutplättchen bei Infektionen. Monatsschr.f.Kinderhkl. Bd.29 H. 6 1925 S.673- 680.
- Becker :Untersuchungen über Thrombocyten im Kindesalter. Arch. f.Kinderhkl. Bd.107 1936 H.4 S.230-237.
- Boshammer :Über Zählung, Resistenz und Neubildung von Blutplättchen. Zeitschr.f.experim. Mediz.Jg. 48 S. 631-639 1926
- E. Fanton :Le piastrine nell' infanzia.
Clin. peratr. 14 1932 S.131-152.
Auszug aus dem Zentralbl.f.d.ges.Kinder. 1932 Bd. 26 S.692
- Gerloff :Vergleichende Betrachtung über die Thrombocytenzählmethoden von Fonio und Jürgens. Dtsch.Med.Wochschr.1935 Nr.39 S.1557-58
- Jürgens :Eine Mikromethode zur Thrombocytenzählung (Hautblutmethode).
Klin.Wochenschr.1934 S.97-99.
- Kassay-Farkas:Vergleichende Untersuchungen im Kindesalter über Thrombocytenwerte. Arch.f. Kinderhkl.1936 109.Bd. 1.H. S.29-34.
- Lorenz :Der Einfluss des A Vitamins auf die Thrombocyten. Zeitschr.f.Kinderhkl. 58.Bd.4. H. S. 504-514 1936.

E. Schiff und C. : Untersuchungen zur Frage des Morb.
Hirschberger mac. Werlh.

Ein bisher unbekannter Thrombocy-
tose herbeiführender Stoff, der
fettlösliche T Faktor.

Jahrb.f.Kinderhkl. 146.Bd. d.3.Fol-
ge 1 1936 S. 181-190, 191-196,
293-296.

147. Bd. d. 3. Folge H.2 1936
S. 81-85.

L e b e n s l a u f .

Am 4.5. 1910 wurde ich, Wolfgang Runze, als Sohn des Studienrats Prof. Runze in Ratibor O/S. geboren. Von 1916 bis 1920 besuchte ich die Städt. Volksschule in Ratibor, anschliessend das Städt. Realgymnasium in Ratibor. und erhielt 1930 das Reifezeugnis. Die beiden folgenden Jahre war ich als Apothekerpraktikant in Erfurt tätig und legte dort im März 1932 das Apothekervorexamen ab. Im Anschluss daran studierte ich Medizin und legte die ärztliche Vorprüfung in Jena 1934 ab. Die ersten beiden klinischen Semester studierte ich in München, das folgende in Frankfurt, Die drei letzten Semester verbrachte ich in Halle/S., wo ich am 21.12.37 die ärztliche Prüfung ablegte. Ich besitze die Deutsche Reichsangehörigkeit und bin in Ratibor beheimatet.
